

Pracownia Endoskopii NZOZ Medicus s.c.
Alicja i Dariusz Leńczyk Grajewo oś. Południe 9

Zgoda na gastrokopię

W związku z Pana/Pani dolegliwościami zalecone zostało badanie endoskopowe, umożliwiające ocenę stanu górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Przygotowanie do badania

W przeciągu 6 godzin poprzedzających badanie nie należy pić i jeść. Na czas badania należy wyjąć ruchome protezy.

Przebieg badania

Przed rozpoczęciem badania gardło Pani /Pana zostanie spryskane sprayem znieczulającym. Może pozostać po nim uczucie niewielkiego drętwienia w jamie ustnej i możliwość zachłyśnięcia w krótkim czasie po badaniu.

Wprowadzany będzie endoskop - cienki, giętki gładki instrument (średnicy ok. 1,0 .cm) przez usta, gardło do przełyku, a następnie do żołądka i dwunastnicy. Będzie możliwe uwidocznienie na ekranie monitora błony śluzowej i ocena jej wyglądu w poszczególnych częściach górnego odcinka przewodu pokarmowego. Do dokładnej oceny wszystkich części badanych narządów potrzebne jest wprowadzenie (wdmuchiwanie) powietrza, co może wywołać uczucie niewielkiego wzdęcia i odbijanie. Możliwe jest też, za pomocą specjalnych szczypczyków, wprowadzanych, przez kanał w endoskopie, pobieranie małych wycinków do badania mikroskopowego, co umożliwia postawienie diagnozy. Pobieranie takich wycinków jest zupełnie niebolesne, całkowicie bezpieczne i zwykle bardzo sprawne. Najczęściej badanie trwa od 5-ciu do 10-ciu minut.

Badanie żołądka należy do badań o niskim ryzyku powikłań. Komplikacje zdarzają się statystycznie raz na kilka tysięcy badań Należą do nich:

- skaleczenia, błony śluzowej i mechaniczne uszkodzenia badanego narządu - (przedziurawienie wole.. 0,55% badań),
- zaburzenia ze strony układu sercowo- naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, zaostrenie w przebiegu, choroby niedokrwiennej serca I związane z tym bóle dławicowe),
- reakcje uczuleniowe na użyte środki znieczulające,
- zaburzenia oddechowe.

Po badaniu

Przez 30-60 min po badaniu-z pobraniem wycinków nic nie jeść i nie pić a przez dwie godziny unikać gorących, posiłków i płynów. Ponieważ w związku ze znieczuleniem gardła mogą wystąpić trudności w podaniu należy mieć na względzie możliwość zachłyśnięcia – przez kilka godzin jeść ostrożnie i powoli.

Informacje o pacjencie

Dla pełnego bezpieczeństwa przeprowadzenia badania prosimy o podanie poniższych, informacji:

1. czy występują u Państwa zaburzenia krzepnięcia krwi (skłonność do krwawień, łatwe powstawanie dużych siniaków, przedłożone krwawienie po skaleczeniu, po ekstrakcji zęba, krwawienie z dziąseł przy myciu zębów)?
TAK **NIE**
2. czy przyjmujecie Państwo leki p/krzepliwe (Sintrom, Acenokumarol, Polopiryne, Aspirynę, Acard, Polocard, Bestpiryn)?
TAK **NIE**
3. czy występuje u Państwa alergia (jeżeli tak to na co)?
TAK **NIE**
.....
4. czy występują u Państwa choroby serca/układu oddechowego (jeżeli tak to jakie)?
TAK **NIE**
.....

Zgoda pacjenta

O przebiegu badania i możliwych komplikacjach zostałem wyczerpująco i zrozumiale poinformowany. Dobrowolnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie proponowanego badania.

.....

Data

.....

Podpis pacjenta